

Germevin

CARACTERISTICAS GENERALES

GERMEVIN®350 ST es un insecticida carbamato que actúa por contacto e ingestión, formulado como suspensión acuosa para su uso en tratamiento de semillas de maíz antes de la siembra, proporcionando protección durante la germinación y la primera etapa del desarrollo del cultivo.

GERMEVIN®350 ST es una formulación especialmente diseñada para usarse exclusivamente en el tratamiento de semillas, para lo que deberá usarse equipo adecuado con el fin de obtener una buena dosificación, un cubrimiento uniforme y evitar daño a la semilla.

GERMEVIN®350 ST debe agitarse antes de usarse. Aunque es preferible tratar semillas que no hayan recibido previamente ningún tratamiento, la aplicación de

GERMEVIN®350 ST con el equipo adecuado ofrece un buen cubrimiento de semillas previamente tratadas con otros productos protectores.

Trate únicamente la semilla que va a utilizar para la siembra y los sobrantes de semilla tratada deberán germinarse para evitar que se usen con fines alimenticios, forrajeros o para la extracción de aceite.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- LLENE EL EQUIPO DE APLICACIÓN A FAVOR DEL VIENTO PARA EVITAR DERRAMES.
- NO APLIQUE EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO NI EN INTENSAS HORAS DE SOL.
- UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES.
- NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
- BANESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, ansiedad, ambliopía, debilidad, náuseas, calambres, diarreas, y opresión torácica. Los signos son: sudoración, lagrimeo, salivación, vómitos, cianosis, paledema y sacudidas musculares incontrolables. En casos extremos se puede presentar convulsiones, pérdida de los reflejos, y pérdida de control de los esfínteres, coma y paro respiratorio.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón y aplíquese vaselina.

Si la molestia persiste, consulte al médico y muéstrele esta etiqueta

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado.

Afije las prendas de vestir y vigile la respiración

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MEDICO:

Este producto es un insecticida carbamato, por tanto es un inhibidor reversible de la colinesterasa. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

Antídoto: Aplicar 1.0-2.0 mgr. (adultos) y 0.02-0.05 mg/Kg de peso (niños) de sulfato de atropina por vía intravenosa si sobreviene secreción excesiva. Manténgase al paciente completamente atropinizado. No administre atropina a una persona cianótica, primero aplique respiración artificial y después el sulfato de atropina. Está contraindicado el uso de los reactivadores de colinesterasa como 2-PAM, otras oximas y los opiáceos.

• PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

• NO TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

• NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

INSECTICIDA-CARBAMATO THIODICARB

Insecticida para Tratamiento de Semillas
SOLUCION CONCENTRADA

Ingrediente Activo:

THIODICARB..... 31.50%
(Equivalente a 350 gr i.a./Litro)

Ingredientes Inertes:

Diluyentes y condicionadores..... 68.50%

REGISTRO:

VIGENCIA DEL REGISTRO: INDETERMINADA

FECHA DE ELABORACIÓN:

LOTE DE FABRICACIÓN:

Contenido neto: 200 Litros

No se almacene junto a productos alimenticios

No reutilice este envase, destrúyase

No se deje al alcance de los niños

FABRICADO POR:



ExcelAg Corporation
Corporate Headquarters
7300 North Kendall Drive, Suite 521
Miami, Fla. 33156-7851, USA
www.excelag.com
EPA Establishment # 33967-NJ-1

DISTRIBUIDO POR:



AGRIPEC S.A.
Córdova 623 y P. Solano.
Guayaquil, Ecuador
www.agripac.com.ec

INSTRUCCIONES DE USO

USESE EXCLUSIVAMENTE EN CULTIVOS AQUÍ RECOMENDADOS

CULTIVOS	DOSIS Por saco de semilla	PLAGAS A CONTROLAR
MAÍZ Y SORGO	300 c/saco de semilla 2 Lit/ 100 kg de semilla	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Gusano alambre (<i>Agrotis spp</i>) Gusano saltarín (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>)
ALGODÓN	2-2.5 Lit/100 kg de semilla	Gusanos trozadores (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis malefida</i> , <i>Euxoa auxiliaris</i> , <i>Pentidroma saucia</i> , <i>Feltia subterranea</i> , <i>Spodoptera ornithogalli</i> , <i>Spodoptera praefica</i>)
SOYA	300 c/saco de semilla	Gusanos trozadores (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis malefida</i> , <i>Euxoa auxiliaris</i> , <i>Pentidroma saucia</i> , <i>Feltia subterranea</i> , <i>Spodoptera ornithogalli</i> , <i>Spodoptera praefica</i>)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Guarde este producto en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, en un almacén aislado. Ordene perfectamente las estibas del almacén, utilizando tarimas. Limitar la altura de las estibas al máximo tolerable sin que lo empaques de los envases de la parte inferior se dañen.

Agitarse bien antes de usarse. Se recomienda no almacenar **GERMEVIN®350 ST** junto a los productos alimenticios, vestimentas o forraje. Mantener producto lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Mantener este producto alejado del calor y del fuego directo.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agregar la mitad del volumen de agua y luego adicionar la dosis recomendada de **GERMEVIN®350 ST**. Agitar la solución y luego completar el volumen de agua, manteniendo la agitación para obtener una solución uniforme.

Utilice soluciones frescas al comienzo de cada día aplicación. Elimine desechos al final del día, de acuerdo a las normas vigentes de eliminación de desechos

INCOMPATIBILIDAD:

GERMEVIN®350 ST es incompatible con sales metálicas pesadas o con fungicidas como Mancozeb, Maneb, Zineb, Sulfato de Cobre y caldo Bordalés.

FITOTOXICIDAD:

GERMEVIN®350 ST no produce efectos fitotóxicos cuando se usa en los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta

AVISO DE GARANTIA:

La Compañía fabricante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original y bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

La Compañía fabricante limita su responsabilidad en la venta de este producto a la reposición del mismo en el caso de que encuentre defectuoso. Debido a que su uso y manejo esta fuera de nuestro control, no se acepta responsabilidad alguna en cuanto a daños y perjuicios a personas, cultivos, y suelos.

LIGERAMENTE TOXICO



LIGERAMENTE TOXICO